

Oenothera biennis (Teunisbloem)



KENMERKEN

Soort plant: tweejarig

Winterhardheid: goed

Grondsoort: alle grondsoorten, ook voedselarme zandgrond

Vochtigheid: betrekkelijk gering

Licht: zonnig

Hoogte: 200 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: felgeel. Bloem trekt door heerlijke geur vlinders en bijen aan.

Bloeitijd: juli - oktober

Bijzonderheden: opent pas 's avonds als het gaat schemeren zijn bloemen.
Doosvrucht.

Ophiopogon planiscapus Niger, (zwart gras, slangenbaard)



KENMERKEN

Soort plant: vast, behoort niet tot de grassenfamilie maar tot de liliëfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normaal

Vochtigheid: normaal

Licht: zon tot half schaduw

Hoogte: 20-25 centimeter

Blad / Loof: bijna zwart glanzend

Bloemkleur: wit tot licht roze en glanzend zwarte vruchten

Bloeitijd: augustus - september

Bijzonderheden: bodembedekker die zich met ondergrondse uitlopers langzaam uitbreidt zonder echt lastig te worden. Vraagt weinig onderhoud.

Ornithogalum Arabicum

(vogelmelk of 'ster van Bethlehem')



KENMERKEN

Soort plant: geslacht van bolgewassen uit de aspergefamilie (*Asparagaceae*) afkomstig uit Zuid-Europa.

Winterhardheid: matig, overleefd alleen zeer zachte winters

Grondsoort: goed doorlatende kalk-, zandgrond

Vochtigheid: niet te vochtig

Licht: lichte schaduw tot zon

Hoogte: 40 tot 80 cm

Blad / Loof: groene bladeren met stelen. Bladverliezend **Bloemkleur:**

wit, crèmekleurig met zwarte vruchtdoos.

Bloeitijd: juli - september

Bijzonderheden: de bollen zijn eetbaar, vergelijkbaar met schorseneer. De stengel met bloemknop van de bosvogelmelk wordt op dezelfde manier als asperges gegeten (in Parijs zeer gewild) en heet daar "asperges de bois", niet te verwarren met de echte bosasperge (*Asparagus acutifolius*).

Osmunda regalis (Koningsvaren)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: zeer humusrijk tot veenachtige grond

Vochtigheid: zeer groot

Licht: lichte schaduw tot zon

Hoogte: tot 175 centimeter

Blad / Loof: half wintergroen

Bloemkleur: niet van toepassing

Bloeitijd: januari

Bijzonderheden: de wortels van de inheemse koningsvaren werden vroeger gedroogd gebruikt en het blad werd wel als luiswerende matrasvulling toegepast. Deze natuurlijke afweer maakte het ook zeer geschikt om orchideeën op te kweken.

Breidt zich uit door kruipende wortelstok.

Pelargonium australe

(geranium, ooievaarsplant)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant, kruid uit Australië uit de familie Geraniaceae

Winterhardheid: niet winterhard

Grondsoort: goed waterdoorlatend

Vochtigheid: niet te nat

Licht: zonnige plaats vooraan in de border

Hoogte: 50 cm

Blad / Loof: hartvormige groene bladeren

Bloemkleur: witroze met paars, lila

Bloeitijd: juni - oktober

Bijzonderheden: zaait zich gemakkelijk uit en kan gebruikt worden in rotstuinen en in potten.

Pelargonium inquinans (geranium)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit het geslacht Pelargonium van de familie Geraniaceae, die inheems is in de zuidwestelijke Kaap van Zuid-Afrika.

Winterhardheid: niet winterhard

Grondsoort: goed waterdoorlatend (droge grond)

Vochtigheid: niet te nat

Licht: zonnige plaats vooraan in de border

Hoogte: 50 cm

Blad / Loof: fluweelvormige, groene bladeren met stevige stengels

Bloemkleur: oranje, scharlaken rood

Bloeitijd: juni - september

Bijzonderheden: vorstvrij opslaan in de winter.

Pelargonium Trifidum (geranium)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit het geslacht Pelargonium van de familie Geraniaceae, die inheems is in de West- en Oost Kaap van Zuid-Afrika.

Winterhardheid: niet winterhard

Grondsoort: goed waterdoorlatend (droge grond)

Vochtigheid: niet te nat

Licht: zonnige plaats

Hoogte: 70 – 100 cm (mits ondersteund door andere planten)

Blad / Loof: fluweelvormige, groene bladeren met stevige stengels

Bloemkleur: wit, crèmekleurig – paars hart

Bloeitijd: mei - oktober

Bijzonderheden: aromatische bladeren. Plant is niet winterhard advies is om plant vorstvrij opslaan in de winter.

Pelargonium vitifolium (wijnbladige geranium)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit het geslacht Pelargonium van de familie Geraniaceae, die inheems is in het zuidwesten van de West Kaap van ZuidAfrika.

Winterhardheid: winterhard

Grondsoort: goed waterdoorlatend (droge grond)

Vochtigheid: niet te nat

Licht: zonnige plaats

Hoogte: 70 – 100 cm

Blad / Loof: hartvormige grof getande bladeren

Bloemkleur: roze met hardroze hart. Een stengel bevat soms 10 bloemen

Bloeitijd: mei - oktober

Bijzonderheden: bladeren geven citroenachtige geur af. Kan uitgroeien tot houtachtige struik die dan de vorst kan overleven.

Penstemon hirsutus, (*slangekop*)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de helmkruidfamilie

Winterhardheid: hebben de naam niet echt winterhard te zijn

Grondsoort: goed waterdoorlatend en humeuze grond voor een goede groei.

Vochtigheid: niet te nat

Licht: zonnige plaats vooraan in de border

Hoogte: 20 - 30 cm

Blad / Loof: donkergroen en kleverige stengels

Bloemkleur: meerkleurig wit, lila

Bloeitijd: mei - juli

Bijzonderheden: na de bloei de uitgebloeide bloemen verwijderen, in de winter licht beschermen met een droge mulch.

Pennisetum alopecuroides

‘Hameln’,

(Lampepoetsersgras)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: matig

Grondsoort: licht humeuze grond of grond, die goed water doorlatend is en permanent licht vochtig blijft

Vochtigheid: vochtig

Licht: Zonnig en beschut

Hoogte: 40 - 80 centimeter

Blad / Loof: bladhoudend

Bloemkleur: bruin, geel, groen

Bloeitijd: juli - augustus

Bijzonderheden: de pluim werd vroeger wel als rager voor de cilindervormige glazen kap van de olielamp gebruikt. Daar heeft het zijn naam dan ook aan te danken.

Persicaria amplexicaulis

(duizendknoop)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: alle grondsoorten

Vochtigheid: matig vochtig

Licht: zon

Hoogte: 100-125 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: paars

Bloeitijd: augustus - oktober

Bijzonderheden: geen bijzonderheden , kunnen woekeren.

Phlox subulata (kruippfhlox)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: goed doorlatend humusrijke grond

Vochtigheid: groot

Licht: zon tot halfschaduw

Hoogte: 10-20 centimeter

Blad / Loof: priemvormig wintergroen blad, behaard

Bloemkleur: violet blauw

Bloeitijd: april t/m juni

Bijzonderheden: bodembedekker, zodevormend

Phlox paniculata (vlambloem)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: zeer goed

Grondsoort: humusrijke tuingrond

Vochtigheid: vrij groot

Licht: zon, eventueel iets schaduw

Hoogte: 75-175 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: allerlei kleuren (geen geel)

Bloeitijd: augustus - oktober

Bijzonderheden: geurende bloemen verder geen bijzonderheden

Phlomis russeliana (brandkruid)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: niet helemaal

Grondsoort: gewone tuingrond, kalk mag

Vochtigheid: droog tot matig vochtige grond

Licht: zon

Hoogte: 75 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: geel

Bloeitijd: juni - september

Bijzonderheden: geen bijzonderheden

Physalis alkekengi (lampionplant)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: alle grondsoorten (kalkrijk)

Vochtigheid: matig vochtig

Licht: zon tot halfschaduw

Hoogte: 80-120 centimeter

Blad/Loof: bladverliezend

Bloemkleur: oranjerood

Bloeitijd: augustus - september

Bijzonderheden: oranjerode schijnvrucht met daarin een vrij grote besvrucht. Kan woekeren.

Physalis peruviana

(ananaskers, Kaapse kruisbes of goudbes)



KENMERKEN

Soort plant: vast plant uit de nachtschadefamilie (*Solanaceae*), afkomstig uit Andesgebergte

Winterhardheid: goed

Grondsoort: alle grondsoorten (kalkrijk)

Vochtigheid: matig vochtig

Licht: zon tot halfschaduw

Hoogte: 150- 200 centimeter en breed vertakt

Blad/Loof: groen, bladverliezend, verdwijnt in zijn geheel 's winters

Bloemkleur: geel / oranje

Vrucht: oranje van kleur en circa 1 tot 2 cm in doorsnede. De vruchten worden omhuld door een lichtbruine kelk. Deze kelken zorgen ervoor dat de vrucht bescherming heeft tegen insecten

Bloeitijd: augustus - september

Bijzonderheden: de vruchten smaken licht aromatisch zoet tot zoetzuur en heeft wat weg van zoete kruisbessen. De vruchten kunnen zo gegeten worden, zijn zeer smaakvol, maar er kan ook jam, compote van gemaakt worden.

Physostegia virginiana (scharnierbloem)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: goed gedraineerde humusrijke grond

Vochtigheid: veel water

Licht: zon

Hoogte: 100-120 centimeter

Blad: loof /bladverliezend

Bloemkleur: roze, rozerode of witte bloemen in een aarvorm

Bloeitijd: juli - september

Bijzonderheden: windgevoelig

Pittosporum tobira



KENMERKEN

Soort plant: kuipplant

Winterhardheid: niet, 's winters naar binnen

Grondsoort: vruchtbare goed humusrijke grond

Vochtigheid: groot

Licht: zon

Hoogte: 40-300 centimeter

Blad / Loof: groen, glanzend

Bloemkleur: wit geurend; na de bloei ontwikkelen zich ronde, bleekgroene vruchten, die kleverig zijn

Bloeitijd: juni - oktober

Bijzonderheden: mediterrane plant/struik

Polygonatum multiflorum

(Salomonszegel)



KENMERKEN

Soort plant: vaste, inheemse plant uit de aspergefamilie (*Asparagaceae*). Sommige soorten van dit geslacht zouden medisch bruikbaar zijn. In Azië worden een aantal soorten in kruidenthee gebruikt.

Winterhardheid: ja

Grondsoort: goede tuingrond

Vochtigheid: vochtig

Licht: half schaduw

Hoogte: 40 tot 70 cm of hoger

Blad: groen

Bloemkleur: witte kelkjes die in trosjes van 2 aan de takken hangen

Bloeitijd: mei - juni

Bijzonderheden: de naam heeft alleen indirect te maken met koning Salomo uit de Bijbel, door de littekens die afgestorven bloemstengels uit vorige jaren op de wortelstok achterlaten. Zaait zichzelf uit.

Polemonium

(Jacobs ladder of hemelladder)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de vlambloemfamilie. Mooie plant voor border of rotstuin

Winterhardheid: ja

Grondsoort: zandgrond of goede tuingrond

Vochtigheid: vochtig

Licht: zonnig tot half schaduw

Hoogte: 40 tot 70 cm

Blad: lancetvormig en staan als treden van een ladder in paren naast elkaar, vandaar de naam jacobs- of hemelladder.

Bloemkleur: lavendelblauwe bloemen met gele meeldraden

Bloeitijd: juli- september

Bijzonderheden: kan tegen extreme kou. Vormt ronde pollen en zaait zich gemakkelijk uit.

Primula veris

(sleutelbloem)



KENMERKEN

Soort plant: een plant uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae)

Winterhardheid: goed

Grondsoort: iedere normale grond

Vochtigheid: normaal

Licht: zon

Hoogte: 15 – 30 centimeter

Blad: De bladeren vormen een rozet, dat langwerpige en getande is. Het rozet eindigt in een gevleugelde, behaarde steel.

Bloemkleur: geel van kleur. In de keel zitten oranje vlekken

Bloeitijd: april - juni

Bijzonderheden: Sagen uit diverse streken berichten dat Petrus de hemelsleutel uit zijn handen heeft laten vallen. De sleutel kwam op aarde terecht, waar in zijn afdruk de sleutelbloem ontkiemde. De hemelse poortwachter heeft de sleutel door een engel weer laten halen.

Primula

(sleutelbloem)



Kenmerken:

Soort plant: vaste plant uit de sleutelbloemfamilie (Primulaceae). Er zijn > 500 soorten

Winterhardheid: zeker

Grondsoort: iedere normale grond

Vochtigheid: normaal

Licht: half schaduw tot schaduw

Hoogte: 15 – 20 centimeter

Blad: De bladeren vormen een rozet, dat langwerpig en getand is. Het rozet eindigt in een gevleugelde, behaarde steel.

Bloemkleur: blauwe bloemen op een steeltje

Bloeitijd: maart - april

Bijzonderheden: Primula is afgeleid van primus wat "eerste" betekent. Zij zijn nl een van de eerste voorjaarsbloeiers.

Prunella Grandiflora

(Bijenkorfje, brunel/prunel)



KENMERKEN

Soort plant: bodembedekkende vaste plant uit de Lamiaceae

Winterhardheid: goed

Grondsoort: kalkminnende droge bodem

Vochtigheid: normaal

Licht: zon tot half schaduw

Hoogte: 20 - 25 centimeter

Blad: groen, bladverliezend

Bloemkleur: roze/ paars

Bloeitijd: juni – begin oktober

Bijzonderheden: het is een uitstekende plant om een tapijt te vormen. In bloei is het een zee van golvende aren, die lilapaars of diep lila-roze van kleur zijn. Trekt bijen aan.

Pyrethrum



KENMERKEN

Soort plant: volkomen

Winterhardheid: goed

Grondsoort: iedere normale grond

Vochtigheid: normaal

Licht: zon

Hoogte: 45 – 100 centimeter

Blad: groen , bladverliezend

Bloemkleur: wit met gele kern

Bloeitijd: juni - juli

Bijzonderheden: Pyrethrum is al eeuwenlang gebruikt als insecticide en als luizenremedie in het Midden-Oosten (Perzische poeder, ook bekend als "Perzisch glaskruid")

Ribes rubrum (aalbes)



KENMERKEN

Soort plant: struik afkomstig uit de ribesfamilie - Grossulariaceae

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: Niet te nat

Licht: zonnig

Hoogte: 100 – 150 centimeter

Blad / Loof: handlobbig blad met vijf lobben

Bloemkleur: licht geel - groen

Bloeitijd: april - mei

Bijzonderheden: De aalbes bevat vrij veel Vitamine B1 en C, en veel ijzer, fosfor, kalium, voedingsvezel, koper en mangaan. Gedroogd worden ze beschouwd als heel alkaliserend. Aalbessen kunnen medisch gebruikt worden: ze zouden koorts reduceren, zweet induceren, menstruatie induceren en een mild laxermiddel zijn. Ook zou het een bloedstelpend en eetlust vergrotend middel zijn, en ook een diureticum zijn met invloeden op de spijsvertering.

Rosa glauca (struikroos)



KENMERKEN

Soort plant: vaste, simpele struikroos afkomstig uit de Franse bergen

Winterhardheid: zeer goed

Grondsoort: goede tuingrond, niet te droog

Vochtigheid: niet te droog

Licht: zonnig

Hoogte: 150 – 200 centimeter

Blad / Loof: blauw, grijs blad

Bloemkleur: roze bloemen met wit hart

Bloeitijd: juli - augustus

Bijzonderheden: wordt meestal gebruikt als een natuurlijke afscheiding. Als haag geven ze kleur en sfeer. Bloeit op oud hout. Na de bloei ontstaan oranje-rode rozebottels waar ook jam van gemaakt kan worden. Na de bloei een weinig snoeien om het volgende jaar weer bloemen en bottels te krijgen.

Om de 3 jaar een deel van de oudste takken voor een kwart terug snoeien.

Rudbeckia fulgida (zonnehoed)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: zeer goed

Grondsoort: goed voedzame, vocht vasthoudend

Vochtigheid: vochtige tot natte standplaats

Licht: zon

Hoogte: 150-200 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: warm goudgeel

Bloeitijd: augustus - september

Bijzonderheden: windgevoelig, zo nodig ondersteunen

Pulmonaria officinalis (longkruid)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: zeer goed

Grondsoort: humusrijke voedzame grond

Vochtigheid: betrekkelijk groot

Licht: half schaduw

Hoogte: 15- 25 centimeter

Blad / Loof: wintergroen

Bloemkleur: aanvankelijk violetblauw, later lilablauw van kleur

Bloeitijd: april- mei

Cult: 'Sissinghurst White'

Bijzonderheden: geen bijzonderheden. Is gevoelig voor meeldauw.

Salvia buchananii

(*Buchanan's salie*)



KENMERKEN

Soort plant: een plantensoort uit de Lipbloemenfamilie

Winterhardheid: niet

Grondsoort: normaal

Vochtigheid: goed doorlaatbare grond

Licht: zonnig **Hoogte:**

Blad / Loof:

Bloemkleur:

Bloeitijd:

Bijzonderheden: werd gevonden in groeiende wolkenbos, dennenbos en eikenbos in het verre noordoosten van de staat Querétaro, Mexico. werd ongeveer 1960 naar Engeland gebracht, waar het door Sir Charles Buchanan werd geteeld. Het heet soms Buchanan's fuchsia salie. Ian Charles Hedge beschreef vervolgens in 1963 *Salvia buchananii* in het botanische tijdschrift . [\[1\]](#)

Salvia hispanica

(chia)



KENMERKEN

Soort plant: een plantensoort uit de Lipbloemenfamilie

Winterhardheid: niet

Grondsoort: normaal

Vochtigheid: goed doorlaatbare grond

Licht: zonnig

Hoogte: tot circa 1 meter

Blad / Loof: groen; tegenovergestelde bladeren 4- 6 cm

Bloemkleur: paars blauw of wit

Bloeitijd: april – juni

Bijzonderheden: uit overleveringen blijkt dat het werd geteeld door de Azteken voordat Columbus Amerika ontdekte, en dat het zo gewaardeerd werd dat het jaarlijks geschonken werd aan de overheersers. Chia wordt in het algemeen geteeld voor het zaad, rijk aan omega 3vetzuren, aangezien 25–30% van het zaad extraheerbare plantaardige olie bevat, inclusief

alfalinoleenzuur (ALA). Chiazaadjes zijn bijzonder klein en ovaal van vorm met een diameter van ongeveer 1 mm, gespikkeld met de kleuren bruin, grijs-zwart en wit.

Salvia microphylla

(var. Hot lips, salie)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de lipbloemenfamilie

Winterhardheid: goed

Grondsoort: doorlatende, vruchtbare tuingrond

Vochtigheid: vochtig

Licht: zon

Hoogte: 70 – 100 centimeter

Blad / Loof: groen, bladverliezend

Bloemkleur: rood – wit. In het begin alleen rood, daarna ook wit.

Bloeitijd: juni - november

Cult: 'Hot lips' **Bijzonderheden:** geen bijzonderheden

Salvia nemorosa

(salie)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal

Licht: zon

Hoogte: 50 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: wit, paars, blauw

Bloeitijd: juni - september

Cult: 'Alba'

Bijzonderheden: geen bijzonderheden

Salvia Wendy's Wish



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de lipbloemenfamilie, Labiatae of Lamiaceae. Afkomstig uit Australië.

Winterhardheid: matig, goed afdekken

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: niet te nat

Licht: zon tot halfschaduw

Hoogte: 50 – 60 centimeter

Blad / Loof: de stengels en de onderkant van het blad zijn kastanjebruin. Als deze breken komt een heerlijke zoete geur vrij, je proeft het bijna.

Bloemkleur: magenta-roze, bordeauxachtige

Bloeitijd: mei - september

Bijzonderheden: heeft geen bijzondere zorg nodig, uitgebloeide bloemen kan je verwijderen. Aantrekkelijk voor bijen en vlinders. De plant kan vrij fors worden, dus knip halverwege het seizoen terug.

Sauromatum venosum

(Voodoo lelie)



KENMERKEN

Soort plant: knolgewas synoniem Typhonium venosum

Winterhardheid: na het afsterven van de plant in de herfst wordt de knol, vóór het intreden van de vorst, uitgegraven en tot eind december binnenshuis opgeslagen bij een temperatuur van ongeveer 10°C.

Grondsoort: potgrond

Vochtigheid: vochtig houden na planten in de tuin

Hoogte: 45-50 centimeter

Blad / Loof: voetvormig, stengels met een blad

Bloemkleur: van buiten groenachtig paars, van binnen groen met paarse vlekjes

Bloeitijd: januari – februari; na het uitbloeien moet u de knol met gewone potgrond bedekken, warm wegzetten en matig gieten

Bijzonderheden: men legt de knol op de vensterbank (december, januari) en vervolgens komt er na twee weken een ietwat bizarre, maar mooie paarse aronskelkbloem uit die ruikt naar rottend vlees! De bedorven vleeslucht is om vliegen aan te trekken.

Saxifraga (steenbreek)



KENMERKEN

Soort plant: bodembedekkende vaste rotsplant, nestelt zich graag tussen tegels, stenen en rotsen

Winterhardheid: goed, bladeren blijven wintergroen

Grondsoort: humusrijke, waterdoorlatende grond

Vochtigheid: matig

Licht: schaduw tot half schaduw

Hoogte: 25 centimeter

Blad / Loof: wintergroen, blijft decoratief in de winter

Bloemkleur: roze, rood, donkerrood

Bloeitijd: maart - april

Bijzonderheden: de naam is afgeleid van de Latijnse woorden 'saxum'= steen en 'frangere'= breken.

Sedum matrona (vetkruid)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale, voedzame tuingrond

Vochtigheid: matig

Licht: zon

Hoogte: 50-60 centimeter

Blad / Loof: half wintergroen

Bloemkleur: roze, rood, donkerrood

Bloeitijd: september - oktober

Bijzonderheden: staat in de top tien van vlinderplanten

Sedum album

(muurpeper, vetkruid)



KENMERKEN

Soort plant: is een vaste, overblijvende plant uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae)

Winterhardheid: goed

Grondsoort: voedselarme grond

Vochtigheid: kan goed tegen droogte

Licht: zonnig

Hoogte: 15 centimeter

Blad / Loof: van lichtgroen tot rood en staan verspreid.

Bloemkleur: wit tot licht roze

Bloeitijd: juni - juli

Bijzonderheden: is te gebruiken in stapelmuurtjes in een rotstuint, als groenblijvende bodembedekker, maar ook zo op het dak te plaatsen. Kan ook gebruikt worden als dakbegroening of als vulling van plantenbakken op branderige plaatsen. Vermeerderen gaat makkelijk door deling.

Sedum spectabile

(vetkruid)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale, voedzame tuingrond

Vochtigheid: matig

Licht: zon

Hoogte: 60 – 80 centimeter

Blad / Loof: stevige rode stengels en opvallende bladkleur (rood, groen)

Bloemkleur: roze, rood, donkerrood

Bloeitijd: september - oktober

Bijzonderheden: staat in de top tien van vlinderplanten

Sceletium tortuosum

(Kanna of kaugood)



KENMERKEN

Soort plant: vetplant uit de ijskruidfamilie

Winterhardheid: niet winterhard tot 2 à 3 graden vorst

Grondsoort: gewone licht bemeste doorlatende grond

Vochtigheid: weinig water nodig

Licht: zonnig

Hoogte: 30 cm. Uit elkaar planten, neemt behoorlijk wat ruimte in.

Blad / Loof: laag groeiende takken en dikke, vlezig bladeren

Bloemkleur: gele kleine bloemen

Bloeitijd:

Bijzonderheden: een plant die van nature voorkomt in Zuid-Afrika. De gedroogde plantenresten wordt gerookt, gekauwd of gesnoven. Staat bekend om psycho-actieve en anti-depressieve werking.

Silphium perfoliatum (*zonnekroon*)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant uit de composietenfamilie, asteracea

Winterhardheid: goed

Grondsoort: humeuze zwavelachtige grond

Vochtigheid: licht vochtig tot vochtig

Licht: zon

Hoogte: 2 – 3 meter

Blad / Loof: groenblijvend

Bloemkleur: geel

Bloeitijd: juni – september

Bijzonderheden: snijbloem, trekt vlinders aan

Silybum marianum

(mariadistel)



KENMERKEN

Soort plant: is een een- of tweejarige plant uit de composietenfamilie (Asteraceae)

Winterhardheid: goed

Grondsoort: humeuze zanderige grond

Vochtigheid: vochtig tot droog

Licht: zonnig tot licht schaduw

Hoogte: 60-150 centimeter

Blad/ Loof: donkergroen met witte nervatuur, blad blijft laag, hoogte ong. 40 cm.

Bloemkleur: purper-roze

Bloeitijd: juni - juli

Bijzonderheden: een distelsoort die unieke medische en therapeutische waarde heeft. Het witte vlekkenpatroon zou volgens overlevering afkomstig zijn van de gemorste melk van de heilige maagd Maria, de moeder van Jezus.

Sisyrinchium angustifolium (blauwogengras)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant

Winterhardheid: redelijk

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: matig tot droog

Licht: zon

Hoogte: 20 centimeter

Blad / Loof: groenblijvend

Bloemkleur: violetblauw

Bloeitijd: mei - juni

Bijzonderheden: wordt ook wel mini-iris en bieslelie genoemd; ook geschikt als rotsplant

Sisyrinchium striatum, (bieslelie)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant voor open ruimte

Winterhardheid: deels tot min 10.

Grondsoort: matig voedselrijk

Vochtigheid: droog tot vochtig houdend

Licht: zon/ halfschaduw

Hoogte: 60 centimeter

Blad / Loof: grijsgroene bladeren

Bloemkleur: licht geel

Bloeitijd: juni - juli

Bijzonderheden: Snoei om de paar jaar na de bloei, door oudere takken die gebloeid hebben, zo diep mogelijk weg te knippen. Laat jong hout staan.

Solanum laciniatum (kangaroo-appel)



KENMERKEN

Soort plant: kuitplant. Afkomstig uit de familie solanaceae van de oostkust van Australië.

Winterhardheid: niet , 's winters naar binnen.

Grondsoort: licht humusrijke, neutrale grond

Vochtigheid: vochtig tot nat

Licht: zon/ halfschaduw

Hoogte: tot 200 centimeter

Blad / Loof: langwerpige, donker groene bladeren

Bloemkleur: violet blauw. Na de bloei verschijnen de eivormige oranjegele bessen. Men ziet gauw wanneer ze rijp zijn dan krijgen ze een wratachtig uiterlijk.

Bloeitijd: mei - juli

Bijzonderheden: geeft paarsblauwe bessen in de herfst; is familie van de aardappelplant. Kan uitgroeien tot een struik mits vorstvrij opgeslagen. Alle delen aan de plant zijn **giftig**, ook de onrijpe vruchten. Rijp zijn ze eetbaar, rauw of gekookt, maar zijn eerder decoratief te noemen dan lekker.

Solidago “Strahlenkrone” (duizendschoon)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: licht zure grond

Vochtigheid: vochtig

Licht: halfschaduw

Hoogte: 60 centimeter

Blad / Loof: groenblijvend

Bloemkleur: geel

Bloeitijd: augustus - oktober

Bijzonderheden: geen bijzonderheden

Sparmannia africana

(kamerlinde)



KENMERKEN

Soort plant: vaste (kamer) plant uit de uit de lindenfamilie (Malvaceae).

Winterhardheid: niet,

Grondsoort: goede potgrond en eens per twee weken extra voeding

Vochtigheid: gedurende het jaar heeft deze plant een wisselende behoefte aan water. Tijdens de bloeiperiode (september-april) moet de potgrond steeds licht vochtig blijven en heeft hij veel voeding nodig, dat u eens per week met het gietwater kunt

Licht: lichte plek maar niet in de volle zon en niet te warm (max. 16°, min 6°)

Hoogte: oorspronkelijk een boom uit Zuid-Afrika die 6 mtr hoog kan worden.

Blad: grote, lichtgroene, viltige bladeren (behaard) die 20-25 centimeter lang kunnen worden

Bloemkleur: witte bloem met bruin hart

Bloeitijd: januari - april

Bijzonderheden: geen gemakkelijke plant voor binnen, blijft doorgroeien, Kies je ervoor om telkens de kop eruit te halen en de zijscheuten terug te snoeien, dan blijft het een struikachtige plant.

Stachys bizantina

(ezelsoren)



KENMERKEN

Soort plant: vast uit de lipbloemenfamilie

Winterhardheid: goed, bladhoudend in de winter

Grondsoort: goede tuingrond voorkeur voor kalkrijke grond

Vochtigheid: niet te nat, goed doorlatende grond

Licht: zonnig

Hoogte: 40 – 50 centimeter , borderplant

Blad: grote, grijze, viltige bladeren (behaard) die 20-25 centimeter lang kunnen worden

Bloemkleur: lila/ roze bloemen op rechtopstaande stengels/ aren

Bloeitijd: juni - augustus

Bijzonderheden: in de oudheid werd het blad gebruikt om wonden te verschonen en de gedroogde bladeren om bij verkoudheid neus en hoofd verlichting te bieden.

Struthiopteris germanica (bekervaren)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: goed

Grondsoort: humusrijke grond

Vochtigheid: groot

Licht: schaduw

Hoogte: 75-100 centimeter

Blad / Loof: half wintergroen

Bloemkleur: niet van toepassing

Bloeitijd: januari

Bijzonderheden: deze planten doen het zelfs op de donkerste plekken nog goed. De bekervaren tref je niet elk voorjaar op dezelfde plaats in je tuin. Ze 'wandelen' via hun wortelstokken door de tuin.

Tagetes patula (Afrikaantjes)



KENMERKEN

Soort plant: eenjarige; nature voorkomend in de warmere streken van Midden-Amerika en vooral in Mexico.

Winterhardheid: niet

Grondsoort: matig voedselrijke grond

Vochtigheid: normaal tot vochtig

Licht: zon tot lichte schaduw

Hoogte: 25 – 60 centimeter

Blad / Loof: groen blad, verdwijnt geheel

Bloemkleur: diverse kleuren tussen geel, rood, oranje

Bijzonderheden: de geur van deze plant houdt wormpjes (nematoden) en ander ongedierte weg wat haar in de volksmond ook de bijnaam "stinkertje" heeft opgeleverd.

Tropaeolum majus

(Oost- Indische kers)



KENMERKEN

Soort plant: eenjarige, kruipende en soms klimmende, kruidachtige plant uit de familie *Tropaeolaceae*.

Winterhardheid: niet

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: droog, licht vochtig

Licht: zon

Hoogte: 20-30 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: geel; oranje, rood gevlekt.

Bloeitijd: juli - oktober

Bijzonderheden: *Tropaeolum* is afgeleid van het Latijnse woord "tropaeum", waarmee een met wapens behangen boom als een teken van de overwinning werd aangeduid. Bloemen, bladeren en zaden zijn eetbaar en doen met hun scherpe smaak denken aan mierikswortel. De Oost-Indische kers wordt ook wel tot de specerijen gerekend. De bladeren kunnen ingezouten worden en de bloemknoppen en groene vruchten kunnen worden gemarineerd. De Oost-Indische kers trekt bladluis aan, evenals de rups van het klein- en groot koolwitje, waardoor deze plant goed ingezet kan worden om de luizen en rupsen weg te houden van andere planten of groenten, zoals groene [savooiekool](#).

Tricyrtis hirta

(Paddelelie of armeluisorchidee)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant binnen de Liliaceae, afkomstig uit Azië (Himalaya, Japan).

Winterhardheid: strenge vorst wordt slecht verdragen

Grondsoort: humeuze, vochthoudende grond

Vochtigheid: voldoende vochtig

Licht: half schaduw

Hoogte: 60 – 80 centimeter

Blad / Loof: groene balderen parallelnervig; bladverliezend

Bloemkleur: wit met paarse vlekken

Bloeitijd: september - oktober

Bijzonderheden: vermeerderen kan door de rijpe zaden meteen te zaaien in volle grond of door het scheuren van de plant in de lente. Scheuren is beter.

Tulbaghia violocaea

(*wilde/kaapse knoflook*)



KENMERKEN

Soort plant: knolgewas behorend tot de lookfamilie, maar niet tot het geslacht Allium (waar uien, prei, knoflook, bieslook... toe behoren)

Winterhardheid: tot -7

Grondsoort: goed gedraineerde grond

Vochtigheid: droog, licht vochtig

Licht: zon

Hoogte: 50 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: lila roze.

Bloeitijd: juli - september

Bijzonderheden: eetbaar knolgewas afkomstig uit Zuid-Afrika. Zo scherp als een echte knoflook, maar na het eten heb je nauwelijks een slechte adem. De plant is vernoemd naar Ryk Tulbagh, een Nederlandse gouverneur op Kaap de Goede Hoop. In de tuin bekend tegen woelmuizen en mollen.

Verbascum nigrum

(zwarte toorts)



KENMERKEN

Soort plant: gedraagt zich als een vaste tweejarige plant

Winterhardheid: goed

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: droog, licht vochtig

Licht: zon

Hoogte: 120-130 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: geel; opvallend donkerroze meeldraden met feloranje helmknoppen.

Bloeitijd: juli - september

Bijzonderheden: vroeger werd toorts daadwerkelijk als fakkel gebruikt. Gedoopt in een harsachtige stof, brandde en smeulde hij uren achtereen. In Duitsland werd een tak boven de bedden van jonge meisjes gehangen. Wanneer de tak van een toorts wordt afgesneden, bloeien de bloemen nog even door. Het meisje dat als eerste een verwelkte toorts had, kon erop rekenen dat de dood haar als eerste zou bezoeken. Niet alleen is toorts de plant van levensernst, maar ook van de liefde en de innerlijke versterking. Medicinaal gebruikt men de plant tegen verschillende kwalen en ziekten.

Verbena bonariensis (ijzerhard)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: matig

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal

Licht: zon, halfschaduw

Hoogte: 100-125 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: roze / paars

Bloeitijd: Juli - september

Bijzonderheden: bloemen zitten in vertakte trossen

Verbena hastata

(ijzerhard)



KENMERKEN

Soort plant: vast

Winterhardheid: matig

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: normaal

Licht: zon, halfschaduw

Hoogte: 100-125 centimeter

Blad / Loof: bladverliezend

Bloemkleur: roze

Bloeitijd: Juli - september

Cult: R'osea'

Bijzonderheden: bloemen zitten in vertakte trossen

Verbena rigida (ijzerhard)



KENMERKEN

Soort plant: vaste plant, afkomstig uit de ijzerhardfamilie

Winterhardheid: redelijk

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: matig

Licht: zon

Hoogte: 70 - 100 centimeter

Blad / Loof: niet groenblijvend

Bloemkleur: paars; uitgebloeide bloemen afknippen om doorgroei te stimuleren

Bloeitijd: juni - oktober

Bijzonderheden: deze Verbena heeft een zeer langdurige bloei

Veronicastrum virginicum (virginische ereprijs)



KENMERKEN

Soort plant: vast/ kuipplant

Winterhardheid: goed

Grondsoort: elke tuingrond

Vochtigheid: vochtig

Licht: zon tot halfschaduw

Hoogte: tot 1,8 meter

Blad / Loof: bladverliezend; bladeren staan in kransen rond de stengel

Bloemkleur: zachtroze tot wit

Bloeitijd: augustus - Oktober

Cult: "Roseum"

Bijzonderheden: kan manshoog worden maar valt niet om!

Vinca major

(groot maagdenpalm)



KENMERKEN

Soort plant: vast, bodembedekker uit de maagdenpalmfamilie, apocynaceae

Winterhardheid: ja

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: niet te nat

Licht: half schaduw. schaduw

Hoogte: 30 - 50 centimeter

Blad / Loof: groen, ook 's winters

Bloemkleur: paarskleurig, violet

Bloeitijd: februari - mei

Bijzonderheden: kan woekeren. Makkelijk te vermeerderen.

Vinca minor

(klein maagdenpalm)



KENMERKEN

Soort plant: vast, bodembedekker uit de maagdenpalmfamilie, apocynaceae

Winterhardheid: ja

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: niet te nat

Licht: half schaduw. schaduw

Hoogte: 15 - 20 centimeter

Blad / Loof: groen, ook 's winters

Bloemkleur: paarskleurig, violet

Bloeitijd: februari - mei

Bijzonderheden: kan woekeren. Makkelijk te vermeerderen.

Zantedeschia aethiopica (aronskelk)



KENMERKEN

Soort plant: vast/ kuipplant

Winterhardheid: ja

Grondsoort: normale tuingrond

Vochtigheid: niet te nat

Licht: zon

Hoogte: 120-150 centimeter

Blad / Loof: groen

Bloemkleur: wit

Bloeitijd: juni - juli

Bijzonderheden: staat graag op een vochthoudende bodem bijvoorbeeld langs de rand van een (natuurlijke) vijver. Kan zich sterk uitbreiden door wortelstokken